

# De Kookaburra Lachende Hans Australische Bosijsvogel Dacelo Novaeguineae

Het geluid, de lachende roep is overal ter wereld bekend. Oorspronkelijk komt de Kookaburra uit het oosten van Australië. Maar hij leeft nu in bijna heel Australië, Nieuw-Zeeland en Tasmanië. Hij wordt ook veel gezien in stadsparken. Het is een nieuwsgierige grappige en tevens vriendelijke vogel. Kookaburra's eten in de natuur alles wat loopt en kruipt: insecten, slangen, slakken, kikkers, kleine zoogdieren en soms zelfs kleine vogels. Dit in tegenstelling tot andere ijsvogels. De kookaburra is ongeveer 39/45 cm groot, en heeft een gewicht tussen 310 en 480 gram. Ze hebben een eigen territorium dat ze verdedigen met hun luide roep maar fysiek wordt er ook verdedigd en dat komt hard aan met zo'n grote sterke snavel!



In gevangenschap zijn het vrij rustige vogels die wel hun harde geluid s'morgens en s'avonds ten gehore brengen. Maar als er iets vreemd gebeurt in de buurt van de volière is het hek van de dam en wordt er pas echt hard geroepen, hier kan geen hond tegenop.

Ik ben nu drie jaar in het bezit van mijn kookaburra's. Ze zitten in een volière van 2 meter breed bij 2 meter lang en 2 meter hoog  
Ik heb het mannetje los gekocht, dat was even schrikken want op de ring stond dat hij van 1992 was ( een oude man dus ).  
Het popje heb ik van een kweker gekocht, zij is van 2003.  
In oktober heb ik ze bij elkaar gezet en vanaf de eerste nacht sliepen ze al tegen elkaar aan. Het klikte meteen!  
In mei werden er drie eieren gelegd. Kookaburra's broeden vanaf het tweede ei.



Vader,  
moeder  
en 3  
jongen

De nestblok is een natuurstam van 95 cm lang en een invlieggat met een doorsnee van 12 cm welke ik horizontaal heb opgehangen.  
Na ongeveer 24/26 dagen worden de eerste kuikens geboren.  
Let op, dan moet er echt overvloedig gevoerd worden anders gooien de grootste jongen de kleinste uit het nest!

Nog een leuke wetenswaardigheid: Vanaf het moment dat er eieren liggen totdat de jongen uitvliegen hoor je de kookaburra's niet meer, ze houden zich erg stil. Ik denk dat dit nog instinct is om hun nest niet te verklappen in de natuur.

Zoals ik al eerder schreef eten kookaburra's alles wat kruipt, loopt en vliegt.



In gevangenschap worden meestal eendagskuikens gevoerd.

Mijn ervaring is echter dat sinds ik muizen voer, mijn kookaburra's veel beter in conditie zijn.

Mijn koppel eet 4 muizen per dag die ik eerst door de carmix ( een kalk en vitaminepreparaat ) haal. Een ander voordeel van muizen is dat ze die makkelijker kunnen doorslikken.

Een kookaburra slaat zijn prooi namelijk net als onze ijsvogel eerst helemaal letterlijk kapot.

Wanneer men eendagskuikens voert zit dan werkelijk heel de volière onder het eigeel, echt een bende dus!

In het voorjaar geef ik ook wel eens grote Afrikaanse sprinkhanen, en als je in de tuin wormen vindt kun je die ook voeren.

Iets anders bijzonder wat ik mijn kookaburra's heb aangeleerd is het vangen en eten van vis.

In de volière staat een bak van 60 cm, gevuld is met water en zomers 10/20 voorntjes in. om te vissen koop goudvisjes.

regelmatig vooral als er worden er veel ( en gevoerd jaar heb ik gezien 3 jongen welke net lieten zien hoe ze de was een van de gezien. Daar doen we het toch allemaal voor. Dat is nou echt vogelliefhebberij!



40 cm en 40 cm die doe ik daar een stuk of Als ik geen tijd heb ik gewoon wat

Deze moet uiteraard aangevuld worden, jongen zijn visjes gegeten denk ik ). Vorig

dat vader en moeder aan

2 weken waren uitgevlogen visjes uit de bak konden vissen. Dit mooiste dingen die ik bij mijn vogels heb



Op het moment dat de jongen net geboren zijn geef ik s'morgens nestmuisjes met carmix eroverheen, ongeveer 5 per jong. Dit doe ik s'avonds rond een uur of 6 nog een keer.

Niet vergeten om ook gewoon 4 volwassen muizen te voeren voor papa en mama. Naarmate de jongen groter worden moet er meer gevoerd worden en ga ik over op nestratjes, ik zorg ook altijd dat er vis voor hun beschikbaar is.

Je kunt ook eendagskuikens in stukken knippen, daar carmix overheen en voeren. Maar mijn voorkeur gaat echt naar muizen en ratten. Ik heb meerdere kookaburra's in mijn handen gehad van verschillende mensen en kan gewoon voelen of ze muizen of kuikens te eten hebben

gekregen. Wanneer men het verschil naast elkaar ziet is het zelfs voor een leek duidelijk. De kleur en glans van de veren is ook een wereld van verschil.




Daar komt bij dat mijn koppel dit jaar bij het eerste legsel maar liefst 4 bevruchte eieren hebben geproduceerd. Normaal in de natuur en toen ik nog eendagskuikens voerde werden er 2 a 3 eieren gelegd.

Dit jaar ( 2007 ) heb ik voor het eerst de eieren geraapt en in de broedmachine gelegd.  
( 26-03 )



Ei 1 30,60 gram = bevrucht  
 Ei 2 28,17 gram = bevrucht  
 Ei 3 28,00 gram = bevrucht  
 Ei 4 25,30 gram = bevrucht



Ze worden in mijn broedmachine met mijn meters op 37,4 graden Celsius en met 46% luchtvochtigheid uitgebroed.

Ik weeg de eieren iedere dag om te kijken hoeveel ze zijn afgevallen.

Zo kan ik controleren of ze wel 15 tot 18 % in gewicht afvallen.

Dit wordt een gemiddelde aangezien het zwaarste en lichtste ei meer dan 5 gram verschillen.

Dit heb ik allemaal verwerkt in een schema.

	Ei 1	afgevallen	Ei 2	afgevallen	Ei 3	afgevallen	Ei 4	afgevallen
Maa 26/03	30,6		25,3		28,17		28	
Din 27/03	30,24	0,36	24,96	0,34	28	0,17	27,74	0,26
Woe 28/03	30	0,24	24,71	0,25	27,79	0,21	27,54	0,2
Don 29/03	30	0	24,53	0,18	27,65	0,14	27,38	0,16
Vrij 30/03	29,8	0,2	24,4	0,13	27,58	0,07	27,24	0,14
Zat 31/03	29,68	0,12	24,24	0,16	27,46	0,12	27,1	0,14
Zon 01/04	0,45	0,23	24,09	0,15	27,38	0,08	26,99	0,11
Maa 02/04	29,27	0,18	23,82	0,27	27,15	0,23	26,72	0,27
Din 03/04	29,21	0,06	23,72	0,1	27,07	0,08	26,65	0,07
Woe 04/04	29,15	0,06	23,62	0,1	27	0,07	26,57	0,08
Don 05/04	29	0,15	23,41	0,21	26,87	0,13	26,33	0,24
Vrij 06/04	28,7	0,3	23,17	0,24	26,69	0,18	26	0,33
Zat 07/04	28,59	0,11	23,04	0,13	26,54	0,15	25,9	0,1
Zon 08/04	28,4	0,19	22,81	0,23	26,45	0,09	25,76	0,14
Maa 09/04	28,22	0,18	22,64	0,17	26,32	0,13	25,61	0,15
Din 10/04	27,8	0,42	22,43	0,21	26,01	0,31	25,15	0,46
<b>Totaal</b>	<b>9,15%</b>	<b>2,8</b>	<b>11,34%</b>	<b>2,87</b>	<b>7,66%</b>	<b>2,16</b>	<b>10,17%</b>	<b>2,85</b>

gemiddeld per dag:  
 0,175 gram =  
 14,87% per 26 dgn  
 als tweede gelegd?

gemiddeld per dag:  
 0,179375 gram =  
 18,43% per 26 dgn  
 als vierde gelegd?

gemiddeld per dag:  
 0,135 gram =  
 12,46% per 26 dgn  
 als eerste gelegd?

gemiddeld per dag:  
 0,178125 gram =  
 16,54% per 26 dgn  
 als derde gelegd?



Na precies 24 dagen zijn de eerste 3 kuikens geboren ( 11 april ). Alleen het vierde ei ( de lichtste ) is nog niet uitgekomen maar het is wel al aangepikt.

De kookaburra kuikentjes zijn heel snel droog ze worden namelijk helemaal kaal geboren, er zit nog niet 1 donsje op.

Na 12/15 uur wordt er voor de eerste keer gevoerd, een halve kleine spiering welke door de carmix is gehaald.

De jongen wegen ongeveer 23 gram.

1 dag later is het vierde jong ook uit het ei gekomen, dit jong heb ik eerst apart gezet in een ander bakje in de kunstmoeder. Zodat ik weet welke jongen ik al gevoerd heb en aangezien het vierde jong de eerste 12/15 uur nog geen eten krijgt is het belangrijk om ze uit elkaar te houden. Na de eerste voeding en ontlasting mag het bij zijn broertjes en of zusjes.

De kunstmoeder staat op dag 1 en 2 op 37 graden Celsius, op de derde dag wordt de temperatuur terug gedraaid naar 34 graden.

15 april, De jongen zijn nu vier dagen oud en worden om de 3 uur gevoerd. s'Nachts ongeveer om de 5/6 uur en overdag dan weer om de 3 uur.

Ze wegen al 55 gram en krijgen nu 2 x spiering en 1 nestmuisje per voeding.

Kookaburra's hebben geen krop zoals de meeste mensen weten van de papagaaien en andere vogels.

Daarom is het belangrijk om voor en na iedere voeding onder aan zijn buik te voelen.

Na het voeren voel je de muis of spiering gewoon in zijn buik zitten, en voor de voeding kun je voelen dat zijn buikje weer leeg is doordat het dan weer zacht aanvoelt en er ruimte is voor nieuw voer.

Als men dit niet doet en je voert teveel, zullen de kuikens doodgaan. Je voert ze letterlijk kapot! Morgen de vijfde dag gaat de temperatuur naar 32 graden.



Nadat de jongen een week oud zijn krijgen de jongen s' nachts om de 6/8 uur eten en overdag nog steeds om de 3 uur. De kuikens leggen nu in de nacht een braakbal en hoeven daarom niet gevoerd te worden.

23 april, De oogjes gaan open! De kuikens zijn ook enorm hard gegroeid en wegen nu 150 gram het wordt tijd om ze te gaan ringen. Hiervoor gebruik ik een ring met een 9mm binnenmaat. Nu staat de temperatuur op 28/30 graden.



27 april, De kuikens beginnen een beetje kleur te krijgen en er vormen zich kleine stoppeltjes... Ze worden nu nog 4 keer per dag gevoerd, ongeveer om de 4 uur.

5 mei, Het gewicht van de “kleine” kookaburra’tjes is inmiddels weer verdubbeld ze wegen nu 300 gram, ook zitten ze al aardig in hun veren wat een week geleden nog maar stoppeltjes waren. Ze krijgen vanaf nu volwassen muizen en nog maar 3 keer op een dag. De temperatuur staat nu op 25 graden.

14 mei, De kookaburra’s die lijken, zijn nu uit al bijna nu kooi 3 maal echter verse leren worden.



al aardig op hun ouders de incubator, ze pasten er niet meer in! Ze zitten binnen in een gewone en worden nog steeds per dag gevoerd, staan er wel continu muizen bij zodat ze zelfstandig te

22 mei, De kookaburra kookaburra kuikens maken al echte geluiden, en voordat ik er erg in had konden ze al vliegen. Terwijl ik aan het voeren was, volgen ze ineens door de huiskamer. Er heeft er zelfs een over de gordijnen heen gepoept. Ja, wat dat betreft maken ze er een bende van binnen, ze zijn nu omgedoopt tot “de Daltons”, want kuikens kan ik ze echt niet meer noemen. De Daltons eten soms al zelf dus voer ik nog maar twee keer per dag 1 muis.

4 juni, De Daltons zitten nu helemaal in de veren en eten volledig zelfstandig. Gezien de weersomstandigheden kunnen ze naar de grote buiten volière



Tweede legsel:

11 april, eerste ei tweede legsel gezien.

17 april, 3 eieren van de kookaburra's in de broedmachine gelegd

5 mei 2 eieren uitgekomen, 6 mei 1 ei uitgekomen.

Derde legsel:

1 mei alweer het eerste ei van het derde legsel

8 mei in de broedmachine gelegd

26/27 mei zijn ze uitgekomen, helaas heeft dit legsel het niet gehaald.

Wanneer ik de temperatuur van de kunstmoeder aan het instellen was is deze op hol geslagen waardoor de temperatuur veel te hoog is

geworden. In twee uur tijd zijn de jongen gestorven. Dit bewijst maar weer hoe zorgvuldig en secuur men dient te zijn.

24 mei, Ondertussen zijn de ouders al aan het vierde legsel begonnen dit jaar. Echt ongelooflijk!

Deze ronde word wat mij betreft de laatste van dit jaar, en mogen ze het weer helemaal zelf doen.

26 mei, Het vierde legsel bestaat uit 3 eieren.

17 juni, Volgens mij zijn de eerste jongen al uitgekomen, maar ik heb nog niet gekeken.

S'middags hoor ik voor het eerst de geluiden van de jongen, er zijn er dus minstens al twee uitgekomen.

Ik voer vanaf nu kleine nestmuisjes bij en voor de ouders gewoon grote muizen. Ik zorg altijd dat er de hele dag voldoende voer is om de jongen te voeren.

3 juli, De jongen groeien geweldig, ik voer nu nog maar twee keer per dag ( s'morgens en s'avonds ) ze krijgen dan al nestratjes in plaats van nestmuizen.

Ook heb ik de afgelopen weken flink wat vis moeten kopen omdat ik zelf niet voldoende tijd had om te vissen. Zodoende zijn ze toch voorzien van alle benodigdheden.

Vandaag zijn deze jongen ook geringd met een stalen(omdat ik dat mooi vind) ring van 9mm binnenmaat.





23 juli, Ondertussen worden de jongen al gevoerd met kleine volwassen muizen door de ouders. Ik voer 2 en een halve muis per jong en 2 muizen per ouder, dat zijn dus 12 muizen per dag!

30 juli, Vandaag is het eerste jong uitgevlogen!

Ik heb de waterbak nu even uit de volière gehaald, misschien is dit niet nodig maar ik neem het zekere voor het onzekere. Jonge kookaburra's zijn nog erg onhandig en ik wil niet dat er een verdrinkt. Als ze alle 3 een paar dagen uitgevlogen zijn zet ik de bak weer terug met nieuwe verse visjes. Dan kunnen de ouders met de vis lessen beginnen.



5 augustus, Er wordt al volop gevist door jong en oud. Het valt alleen echt niet mee om dat goed op de foto te krijgen. Erg leuk om te vermelden is dat iedere vogel s'nachts zijn eigen slaappleats heeft in de volière. Bij mij zit vader rechts naar je toe gericht, daarnaast alle jongen ook met hun hoofd naar je toe en moeder zit links die alles van de andere kant goed in de gaten houdt met haar hoofd dus de andere kant op. Ze kruipen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. Het lijkt dan net of er 50 cm veren op stok zit.

Je kunt de jongen erg lang bij de ouders laten zitten.  
In de natuur is het zelfs zo dat de jongen bij de ouders blijven en helpen de jongen van het volgende legsel grootbrengen.  
Dit is echter in gevangenschap niet aan te raden aangezien ze dan toch een beperkte ruimte hebben.  
De vader zal op den duur wat afstotend worden tegen de jongen.  
Kookaburra's zijn geweldige volière vogels die niet ziektegevoelig zijn en tegen alle weersomstandigheden opgewassen.  
Mijn kookaburra's maken alleen gebruik van hun binnenverblijf indien het overdag meer dan 5 graden vriest.  
En zoals u wel gelezen heeft zorgen ze onder de juiste omstandigheden voor veel nageslacht... Dit jaar ( 2007 ) 13 eieren en 13 jongen uit gekomen.



Wij wensen jullie allen veel vogelplezier!

Door: Jacco Vermeulen en Daniëlle van der Horst  
Voor vragen of meer informatie kunt u 06-53300136 bellen of mailen naar [Jacco@vermeulenhoreca.nl](mailto:Jacco@vermeulenhoreca.nl) of kijk op onze website [www.uilskuiken.nu](http://www.uilskuiken.nu)